

Pauta de suspensión y reinicio de hipoglicemiantes					
Medicamento		Consideraciones clínicas	Previo a cirugía	Día cirugía	Después de cirugía
<b>Hipoglicemiantes orales</b> (Metformina - Glibenclamida)		<p>Contraindicada si fallo renal, acumulación de lactato o hipoxia.</p> <p>Incrementan el riesgo de hipoglicemia transoperatoria.</p> <p>Pueden alterar la motilidad GI y empeorar el postoperatorio.</p>	Dosis habitual	<p><b>Omitir Dosis</b></p> <p><b>Consideración especial:</b> Monitorizar glucemia cada 2 horas y si se observa hiperglucemia administrar insulina rápida s.c.</p> <p>Si mal control de la diabetes o el procedimiento quirúrgico es largo, puede requerir insulina.</p>	<p>Restablecer cuando el paciente inicie la vía oral, excepto en caso de fallo renal, hepático o IC.</p> <p>Si ha precisado insulina, mantenerla hasta que reinicie la ingesta alimentaria.</p> <p>Realizar control glicémico según esquema.</p>
<b>INSULINAS</b>	<b>Acción corta</b> (Cristalina - Glulisina)	Tiempo de ayuno cortos y muy cortos (TAC) si sólo se va a retrasar el desayuno.	Si TAC, <b>dosis habitual.</b>	<p>Si TAC omitir dosis.</p> <p>Si TAL, insulina i.v con infusión de dextrosa-potasio según protocolo institucional.</p>	<p>Si ha mantenido la insulina s.c, administrar dextrosa iv hasta que el reinicie la vía oral (para evitar hipoglucemias).</p> <p>Si ha requerido insulina iv, volver a cambiar a insulina s.c cuando el paciente inicie la vía oral.</p>
	<b>Acción Prolongada</b> (NPH - Glargina)	<p>Tiempo de ayuno largo (TAL) si se omite el desayuno y probablemente el almuerzo.</p> <p>Siempre realice sus acciones guiadas por metas (glucometría) e informe de estas al médico tratante.</p>	Si TAL y complejo, cambiar a insulina iv el día previo a la cirugía (con infusión de Dextrosa -potasio) según protocolo institucional.	<p>Si TAC o muy corto, dar la dosis habitual de la mañana.</p> <p>Si TAC, reducir la dosis a la mitad de la dosis.</p> <p>Si TAL y complejo, insulina iv con infusión de dextrosa-potasio según protocolo institucional.</p>	
<b>Fuente:</b> Cuéllar Obispo, E et al. Manejo perioperatorio de medicación crónica. Sevilla: Consejería de Salud, 2015 [citado 2022 Jun 03]; 34p.					